

分けつ旺盛で茎数多。中干しの遅れに注意!

1 生育概況

6/11 現在の生育 草丈：並 茎数：多い 葉数：並 葉色：並
※コシヒカリ（指標値比） (102%) (111%) (+0.3葉) (SPAD値+0.3)

- 「コシヒカリ」の生育は、草丈、葉数、葉色、いずれも指標値並となっていますが、茎数は多い状況です。**今後の過剰分けつに注意が必要です。**
- 「こしいぶき」の生育も同様に、茎数が多い状況となっています。

田植え	中干し開始時期	管理
5/10	6/5~10	中干し実施中!
5/15	6/10~15	速やかに茎数確認
5/20	6/15~	今後の生育を注視

2 今後の管理

- すでに中干し適期となっているほ場が多く見られます。5月15日頃までに移植したほ場では、**直ちに茎数を確認し、遅れずに中干しを開始してください。**

地域	1株当たり茎数のめやす(本/株)		
	50株植え	60株植え	70株植え
平坦地	17	14	—
中山間地	—	14	12

- 葉数が1枚増えるごとに茎数は急増します。遅植えのほ場でも油断せず田植後25日頃に茎数を確認し、遅れずに中干しを開始しましょう。
- 中干しは、田面に幅1cm程度のヒビが入るまで乾かし地耐力を確保しましょう。
- 例年、生育が過剰となるほ場では強めの中干しを実施しましょう。
- 溝切りにより水を水田全体に効率良く回すことができます。溝切りは必ず実施し、確実に排水溝につないでください。
- 「こしいぶき」も、遅れずに中干しを開始してください。

3 生育調査結果（6月11日現在）

	田植	草丈(cm)				茎数(本)				葉数(葉)			葉色(SPAD)			田植機 セット株数
		本年	指標比	前年比	%	本年	指標比	前年比	%	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差	
コシヒカリ	下稲塚	5/12	29	97	88	358	19	152	162	7.5	+0.5	+0.8	38.6	+1.6	+3.8	60株
	高森	5/12	27	90	78	261	14	111	81	7.4	+0.4	-0.1	40.5	+3.5	+2.0	60株
	行法	5/14	29	97	97	194	13	83	87	6.6	-0.4	+0.0	36.2	-0.8	+1.6	50株
	長崎	5/14	36	118	115	224	12	95	96	6.7	-0.3	+0.0	31.1	-5.9	-1.8	60株
	広島	5/17	33	110	118	272	17	116	123	8.1	+1.1	+1.8	40.1	+3.1	+5.1	50株
	平均		31	102	98	262	15	111	107	7.3	+0.3	+0.5	37.3	+0.3	+2.1	
	今熊	5/18	31	103	100	247	14	118	206	7.0	+0.0	+0.6	37.4	+0.4	+7.3	60株
こしいぶき	関山	5/25	23	82	192	83	4	55	101	5.7	-0.5	+1.1	-	-	-	60株
	下稲塚	5/12	27	96	109	271	15	123	132	7.3	+0.3	+0.1	42.5	+2.5	+2.6	50株
	長崎	5/18	25	88	91	195	10	89	111	5.8	-1.2	0.0	36.3	-3.7	+3.7	60株
	広島	5/12	36	129	124	336	21	153	135	8.0	+1.0	+0.7	46.2	+6.2	+6.9	50株
	平均		29	104	109	267	15	122	127	7.0	0.0	+0.3	41.7	+1.7	+4.4	
今熊	5/15	27	108	93	286	16	143	132	7.8	+0.8	+0.7	36.7	-2.3	+0.4	60株	

4 北陸地方1か月予報（新潟地方気象台 6月7日発表）

- 平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

問い合わせ先 上越農業普及指導センター作物担当（電話025-526-9406）