

平成30年度特別栽培米栽培基準（コシヒカリ・頸北地域特19）実績

(JA名：JAえちご上越)

項目	実施内容
1. 品種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施
	えちご上越ソイル元気（40kg/10a）、（えちご上越ソイルスター（40kg/10a））又は堆肥（500kg/10a）の施用 スーパーシリカプレミアム（ケイ酸肥料）
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒
	育苗消毒 カスミ粒剤／液剤、フェルテラ箱粒剤
	健苗育苗
4. 施肥	育苗 ホーネズ培土1号 70.0 kg/10 a（成分 N・P・K 各0.0325）
	又は川西培土 75.0 kg/10 a（成分 N0.039・P0.058・K0.048）
	又は稚苗苗代配合 0.75 kg/10 a（成分 N0.03・P0.045・K0.0375）
	又はすくすく肥料 1 kg/10 a（成分 N・P・K 各0.1）
	くみあい液肥2号 0.30kg/10 a（成分 N0.0303・P0.012・K0.024）
	又はべんとう肥 0.50kg/10 a（成分N0.04・P0.04・K0.04）
	元肥 有機アグレット816 25kg/10 a（成分 N2.0・P0.25・K1.5）
	追肥 越後の輝き有機50穂肥 20kg/10 a（成分 N2.4・P0.4・K1.6）
5. 移植	植付本数 3～4本/株
	植付株数 50～60株/坪当たり
	稚苗移植 5月10日以降田植え
6. 除草	シュナイデン（1 <sup>※</sup> 粒剤／フロアブル／ジャンボ） 5月中下旬
	（粒剤：移植直後～ル <sup>※</sup> エ2.5葉期 フロアブル・ジャンボ：移植後3日～ル <sup>※</sup> エ2.5葉期 ただし、移植後30日まで） 後期除草剤は使用しない。
7. 中耕	
8. 水管理	6月10日～20日
	溝切り、中干しの徹底による生育調整
	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより
	生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・カメムシ防除 キラップ（粉剤DL／粒剤／フロアブル） 8月上中旬1回
	殺菌剤・・稲こうじ病、墨黒穂病 Zボルト <sup>※</sup> -粉剤DL 出穂20～10日前
10. 乾燥・調製	玄米最終水分調製 14.5～14.9%
	ふるい目 1.85mm使用
	整粒歩合 85%
	千粒重 21～22 g