

# 生育は平年並み。適期中干し励行。

## 1 生育概況

- コシヒカリ：茎数は指標よりやや少から並程度で推移しています。
- こしいぶき：茎数は指標より少なめに推移しています。

5/30 現在の生育  
 コシヒカリ (指標値比)      草丈：並 (100%)      茎数：やや少 (87%)      葉数：並 (▲0.4葉)

	田植日	草丈 (cm)			茎数 (本/m <sup>2</sup> )			葉数 (葉)			備考	
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差		
コシヒカリ	下稲塚	5/11	25	108%	83%	90	106%	100%	4.4	▲0.4	▲1.4	5/30調査
	南新保	5/11	24	104%	114%	67	78%	119%	4.5	▲0.3	▲0.7	5/29調査
	長崎	5/12	21	91%	91%	75	88%	59%	4.7	▲0.1	▲0.2	5/29調査
	上百々	5/19	21	92%	133%	66	77%	73%	4.1	▲0.7	0.1	5/29調査
	平均		<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>74</b>	<b>87%</b>	<b>81%</b>	<b>4.4</b>	<b>▲0.4</b>	<b>▲0.6</b>	
	関山	5/17	21	92%	126%	85	111%	115%	4.0	▲0.3	0.4	5/29調査
こしいぶき	下稲塚	5/11	19	96%	90%	91	70%	69%	4.8	▲0.2	▲1.3	5/30調査
	長崎	5/13	18	90%	86%	74	57%	96%	5.0	0.0	0.3	5/29調査
	平均		<b>19</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>82</b>	<b>63%</b>	<b>78%</b>	<b>4.9</b>	<b>▲0.1</b>	<b>▲0.5</b>	

## 2 今後の管理

新潟地方気象台の1ヶ月予報では、向こう1ヶ月の降水量は平年並みか平年より多い見込みです。降雨が続くと中干しの効果が下がるので、早めの中干しを実施しましょう。

- 活着後は水深2～3cmの浅水管理として水温上昇に努め、初期分けつの発生を促しましょう。
- ワキや表層剥離の見られるほ場では、夜干しを実施しましょう。
- 中干しは、田植後25日で必ず茎数を確認し、遅くとも田植後30日をめやすに開始しましょう。
- 「コシヒカリ」の中干し開始適期の茎数のめやすは、平坦地では目標穂数(360本/m<sup>2</sup>)の7～8割、50株植えて17～19本/株、60株植えて14～16本/株です。
- 溝切りは必ず実施し、排水効果が高まるよう確実に排水溝につないでください。