

ほ場毎に茎数を確認し、遅れず中干し開始！

1 生育概況

○コシヒカリ、こしいぶきとも、生育量が少ないほ場が多く、5月第5半旬からの低温や深水などの影響により葉数の進みや分けつの発生が遅れているほ場が見られます。

6/10 現在の生育（対生育指標値）

コシヒカリ 草丈：並 茎数：少ない 葉数：やや遅 葉色：やや淡
こしいぶき 草丈：並 茎数：少ない 葉数：並 葉色：やや淡

	田植日	草丈 (cm)			茎数 (本/m ²)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD)			備考	
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差		
コシヒカリ	下稲塚	5/11	29	97%	81%	227	97%	95%	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0	34.5	▲ 2.5	▲ 3.7	6/10調査
	南新保	5/11	30	100%	111%	127	54%	123%	5.5	▲ 1.5	▲ 1.1	-	-	-	6/7調査
	長崎	5/12	26	87%	76%	171	73%	60%	6.4	▲ 0.6	▲ 0.5	30.4	▲ 6.6	▲ 6.4	6/7調査
	上百々	5/19	32	107%	110%	187	80%	140%	5.8	▲ 1.2	0.2	-	-	-	6/10調査
	平均		29	97%	91%	178	76%	94%	6.1	▲ 0.9	▲ 0.6	32.5	▲ 4.5	▲ 4.0	
関山	5/17	26	93%	93%	111	74%	63%	5.3	▲ 0.9	▲ 0.3	-	-	-	6/7調査	
こしいぶき	下稲塚	5/11	25	89%	93%	246	112%	92%	7.0	0.0	▲ 0.7	37.0	▲ 3.0	▲ 4.5	6/10調査
	長崎	5/13	29	104%	91%	96	44%	93%	6.5	▲ 0.5	0.2	32.6	▲ 7.4	▲ 2.5	6/7調査
	平均		27	96%	93%	171	78%	92%	6.8	▲ 0.2	▲ 0.2	34.8	▲ 5.2	▲ 3.5	

2 今後の管理

- 活着後は水深2～3cmの浅水管理を徹底し、初期分けつの発生を促しましょう。
- 田植25日後から茎数を確認し、遅くとも田植30日後には中干しを開始しましょう。
- 溝切りは必ず実施し、確実に排水溝につなげましょう。
- 中干しは田面に1cm程度の小ヒビが入るまでしっかりと行いましょう。

表 コシヒカリの中干し開始時の茎数めやす

地域	1株当たりの茎数 (本)		
	50株植え	60株植え	70株植え
平坦地	15	13	—
中山間地	16	13	12